


Cartes de référence recherche bactérienne



Très bon



Bon



Dosage: 1 gr semaine
Période: 2 semaines
Nouvelle mesure



Dosage: 2 gr semaine
Période: 2 semaines
Nouvelle mesure



Dosage: 5 gr par jour
Période : 5 jours en suivant
Nouvelle mesure



Dosage: 5 gr par jour
Période: 7 jours en suivant
Nouvelle mesure

Tableau de référence de pression bactérielle (nombre de germes)

| Niveau de charge | Kolonie aantal (cfu) | Conclusion |
|--------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Charge de base naturelle | < 500 | Très bonne |
| Faible charge | 500 - 5.000 | Bonne |
| Charge moyenne | 5.000 - 30.000 | Acceptable |
| Charge importante | 30.000 - 80.000 | Préoccupante |
| Forte charge | 80.000 - 400.000 | Critique |
| Charge très forte | 400.000 - 1.000.000 | Introduire un traitement |
| Charge extrêmement forte | > 1.000.000 | Introduire un traitement d'urgence |

Tableau de dosage de Virkon®

| Quand | Dans quel but | Dosage | Fréquence | Nombre de dosages | Conditions |
|---|--|----------------------------|--------------------|--|---|
| Hebdomadaire, usage préventif | Pour une pression bactérielle basse et constante et un conditionnement continu de l'eau du bassin | 1 gr par 1.000 litre d'eau | Hebdomadaire | Chaque semaine | Il est important de remplacer 5 à 10% du volume d'eau préalablement au dosage. |
| Début/fin de-saison, usage préventif | Pour une diminution de la pression bactérienne. | 2 gr par 1.000 litre d'eau | Hebdomadaire | 3 fois | Il est important de remplacer 5 à 10% du volume d'eau préalablement au dosage. |
| Quarantaine, usage préventif dans le système de quarantaine | Lors du placement d'un koi dans le système de quarantaine | 2 gr par 1.000 litre d'eau | 2 fois par semaine | Le nombre de semaines qui s'avère nécessaire | Il est important de remplacer 5 à 10% du volume d'eau préalablement au dosage. |
| Quarantaine, usage préventif en bassin | Usage dans le bassin après la période de quarantaine pour abaisser la pression bactérielle. Introduire les kois après cette période. | 2 gr par 1.000 litre d'eau | Hebdomadaire | Le nombre de semaines | Il est important de remplacer 5 à 10% du volume d'eau préalablement au dosage. |
| bassin/Quarantaine | Pour des virus et bactéries persistants. | 5 gr par 1.000 litre d'eau | quotidien | 7 jours | A ce niveau d'assainissement il est essentiel de remplacer 10% du volume d'eau préalablement au traitement. |